Premier® Enamel Pro® Varnish

Barniz de fluoruro sódico al 5 % • Fórmula de ACP

ES

Instrucciones para la atención del paciente después del tratamiento

El odontólogo/higienista ha aplicado un recubrimiento terapéutico de Enamel Pro® Varnish sobre la superficie de varios de sus dientes. Lo notará como una película blanca delgada en la superficie del diente. El residuo de la película es una condición temporaria y no debe tocarse para que pueda brindar los mejores resultados terapéuticos en las áreas tratadas.

Para obtener el beneficio máximo de la aplicación del barniz, recomendamos lo siguiente:

- El Enamel Pro® Varnish debe permanecer en los dientes.
- No cepille ni use hilo dental.
- Mantenga una dieta de alimentos blandos y evite las bebidas calientes y los productos que contienen alcohol durante el período de tratamiento.
- Se debe interrumpir el uso del fluoruro complementario que le haya sido recetado durante 2 a 3 días después del tratamiento (a menos que el odontólogo o el médico indiquen lo contrario).

Un cepillado y uso del hilo dental profundos en sus dientes retirará el remanente del Enamel Pro® Varnish después de que haya finalizado el tratamiento. Después del cepillado, sus dientes volverán a tener el brillo y aspecto normal.

2400049 [00] MPL IFU# 317925 1023048 Rev3